

**MST** Malattie  
Sessualmente  
Trasmissibili  
Proteggi l'Amore





Provincia di Modena

Assessorato alle Politiche sociali, per la salute e per la sicurezza delle persone



Programma territoriale della provincia di Modena  
“Comunicazione e Promozione della Salute”



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena

In collaborazione con:



Comune di Modena



Azione del Piano distrettuale per  
il benessere sociale e sanitario

## MST: Malattie Sessualmente Trasmissibili

I rapporti sessuali non protetti possono trasmettere diverse malattie: esistono più di 30 malattie sessualmente trasmissibili (MST) tra cui l'AIDS causata dal virus HIV. Più precisamente, non sono le malattie che si trasmettono, ma gli agenti infettivi quali i virus, i batteri e i parassiti, che possono poi causare le malattie vere e proprie.

Quindi ci sono persone che possono trasmettere questi agenti infettivi anche se non hanno (o almeno non hanno ancora) sintomi e sembrano perfettamente “sane”. Così, attraverso rapporti sessuali non sicuri (non protetti) con partner occasionali, anche apparentemente sani, si rischia di contrarre delle malattie sessualmente trasmesse.

Le infezioni dell'apparato genitale possono essere causate da diversi microrganismi, in particolare: batteri, miceti (funghi), protozoi e virus. Queste malattie sono attualmente in aumento: le più frequenti sono quelle dovute alla Candida (un fungo), alla Clamidia (un batterio), all'Herpes Virus Simplex (HSV, un virus) e al Trichomonas (un protozoo).

### È importante prestare attenzione ai seguenti segnali:

- secrezioni anomale o pus dalla vagina o dal pene. La donna, che ha già normalmente delle secrezioni, noterà in esse variazioni quantitative e qualitative: colore più chiaro o più scuro ed eventuale cattivo odore;
- sensazione di bruciore, irritazione, dolore durante l'emissione di urina oppure necessità di urinare frequentemente e in piccole quantità;
- comparsa di ulcere, noduli o vescicole sui genitali;
- infiammazione nelle zone genitali;
- ingrossamento delle ghiandole inguinali;
- dolore a uno o a entrambi i testicoli;
- dolori addominali;
- perdite di sangue dopo i rapporti sessuali.

I disturbi elencati potrebbero essere dovuti anche ad altre malattie. Infezioni diverse possono presentare sintomi simili, ma necessitare di cure completamente differenti. È necessario che sia fatta sempre una diagnosi accurata in modo da affrontare la cura più appropriata e il più tempestivamente possibile.

**È quindi importante rivolgersi al proprio medico o a uno specialista allorché dovessero comparire uno o più di questi sintomi. Inoltre è importante informare anche il proprio partner affinché effettui dei controlli e, se necessario, assuma le terapie corrette.**

## Papillomi, condilomi e verruche genitali (HPV)

**Cosa sono e come si trasmettono:** sono infezioni virali provocate dal Papillomavirus (HPV). Si trasmettono attraverso i rapporti sessuali, per semplice contatto cutaneo o, in rarissimi casi, per contatto con materiale contaminato (asciugamani, biancheria intima, sanitari igienici).

**Quali sono i sintomi:** comparsa di piccole escrescenze (singole o a gruppi) denominate Condilomi, creste di gallo o verruche genitali, di colore biancastro o rosato e pruriginose, che crescono sui genitali (pene, vulva, vagina e collo dell'utero) e intorno all'ano. Nei casi più gravi possono essere molto estese o voluminose. Non sempre però la lesione è visibile ad occhio nudo e può essere identificata solo con esami specialistici, eseguiti dal ginecologo per la donna e dal dermatologo per l'uomo, quali il pap test o striscio, la colposcopia, la peniscopia e l'ispezione diretta dei genitali.

**Come si curano:** le escrescenze vengono eliminate attraverso semplici pratiche ambulatoriali con il laser, l'elettrobisturi o la crioterapia, ma anche con creme specifiche. A volte l'infezione si può manifestare di nuovo (recidiva), soprattutto nei casi in cui siano presenti carenze nelle difese immunitarie.

**Se non si curano:** le lesioni possono aumentare di volume e causare prurito e bruciore. In alcuni casi possono scomparire spontaneamente, ma il virus può rimanere nella pelle o nelle mucose anche senza dare manifestazioni evidenti.

**N.B.:** spesso l'infezione non produce sintomi e passa inosservata. È un problema, perché alcuni tipi di infezione da HPV sono **responsabili del tumore del collo dell'utero**. È comunque possibile prevenire questo tumore tramite un semplicissimo esame: **il pap test o striscio**. La ricerca scientifica è riuscita a realizzare dei vaccini efficaci per i tipi di HPV responsabili della maggior parte dei casi di tumore del collo dell'utero e delle malattie correlate a questo virus. Uno di questi è indicato per le giovani donne tra i 9 e i 26 anni e nella nostra regione è prevista (a partire dal 2008) una vaccinazione gratuita alle ragazze in età prepuberale.

**Le malattie sessualmente trasmissibili (MST) si possono prevenire con l'uso corretto del preservativo**

## Candida

**Cos'è e come si trasmette:** conosciuta anche come **mughetto** è provocata da un fungo: la *Candida albicans*. La candida è presente in bocca o nella vagina, dove cresce in equilibrio con l'ambiente. L'infezione si sviluppa quando questo equilibrio si rompe, per es. dopo una cura con antibiotici o un abbassamento delle difese immunitarie determinato da malattie, stress, stanchezza o malnutrizione. Lo stato di gravidanza ed il diabete possono favorire la crescita della candida. Negli uomini si sviluppa per contagio sessuale con partner infetto/a. Il contagio, oltre che per via sessuale, può avvenire anche per contatto indiretto (indumenti o asciugamani contaminati).

**Quali sono i sintomi:** all'interno della vagina provoca intenso prurito, bruciori e una perdita bianca che ha l'aspetto del latte cagliato, molto viscosa. Determina inoltre dolore durante i rapporti sessuali. Negli uomini spesso non provoca sintomi, anche se, talvolta, compaiono sul pene eruzioni rossastre, a volte in rilievo, che causano bruciore e prurito.

**Come si cura:** farmaci antimicotici (candele, creme o capsule orali). In una coppia, in cui l'infezione sia ricorrente, può essere utile trattare anche il partner.

**Se non si cura:** Non ci sono gravi complicazioni, ma può manifestarsi di nuovo.

## Clamidia

**Cos'è e come si trasmette:** è una delle più comuni malattie sessualmente trasmesse. È provocata dalla *Chlamydia trachomatis*, un batterio che si trasmette attraverso i rapporti sessuali vaginali, orali ed anali.

**Quali sono i sintomi:** a volte è priva di sintomi visibili, soprattutto tra le donne. Spesso è facile non accorgersi della clamidia fino a che non si verificano serie complicazioni. Se i sintomi dovessero verificarsi, di solito si manifestano in una o due settimane dopo l'esposizione.

Quando compaiono, di solito sono: infiammazioni del collo dell'utero o dell'uretra, anche con perdite di sangue dai genitali; dolore durante il rapporto sessuale; dolore mentre si urina; dolore pelvico (nella parte inferiore dell'addome) e febbre.

**Come si cura:** la terapia antibiotica è efficace, ma deve essere assunta il più precocemente possibile. Se in una coppia uno dei partner contrae l'infezione, è importante che si curino entrambi per evitare che l'infezione si trasmetta da uno all'altro, anche più volte.

**Se non si cura:** può portare a serie complicazioni, fino alla **sterilità**; nelle donne sono possibili dolori pelvici cronici.

**N.B.:** poiché è spesso priva di sintomi, ci sono molti portatori sani che trasmettono l'infezione senza saperlo. Si può controllare l'eventuale presenza di clamidia attraverso un semplice test: tampone uretrale per l'uomo e tampone cervicale per la donna.

## Herpes Genitale

**Cos'è e come si trasmette:** è un'infezione a livello genitale provocata dall'*Herpes Simplex Virus*, l'HSV2 (l'HSV1 è quello che provoca l'infezione generalmente localizzata al volto, soprattutto nelle labbra). Si trasmette con i rapporti sessuali. Il contagio avviene attraverso il passaggio del virus dalle lesioni infette alle mucose della persona sana.

L'infezione **non** può essere contratta tramite il contatto con gli oggetti usati dalla persona malata (posate, bicchieri, sanitari, ecc.). Infatti nell'ambiente esterno il virus non può sopravvivere.

**Quali sono i sintomi:** normalmente l'infezione è priva di sintomi; se ci sono, si manifestano dopo una settimana dal contagio, con prurito, bruciore e vescicole sui genitali, che si rompono lasciando piccole ulcere dolorose che gradualmente guariscono in 10-12 giorni, di solito senza lasciare cicatrici.

**Come si cura:** si cura con farmaci antivirali (comprese e pomate), che alleviano i dolori e rendono più veloce la scomparsa dei sintomi. Iniziare precocemente la terapia permette di limitare le ulteriori manifestazioni cliniche.

Non ci sono cure che eliminino completamente il virus, che resta nell'organismo tutta la vita. In ogni caso la sintomatologia regredisce rapidamente con una cura adeguata.

**N.B.:** le ulcere genitali aumentano il rischio di contagio di HIV (il virus che causa l'AIDS).

## Tricomoniasi

**Cos'è e come si trasmette:** è un'infezione vaginale causata da un protozoo, il *Trichomonas vaginalis*. Si trasmette soprattutto con i rapporti sessuali, ma anche per contatto con biancheria infetta. Nei maschi colpisce l'uretra.

**Quali sono i sintomi:** il *Trichomonas* può vivere in vagina per anni, senza provocare sintomi. Se i sintomi sono presenti compaiono perdite bianco giallastre, schiumose, di odore sgradevole, con prurito e un'infiammazione che rende dolorosi i rapporti sessuali. Nei maschi in genere non presenta sintomi; raramente provoca infiammazione del glande e fastidio nell'urinare.

**Come si cura:** la cura è rapida (candele vaginali e compresse orali). Poiché spesso non provoca disturbi, è importante informare il partner e curarsi insieme.

**Se non viene curata:** non ci sono gravi complicazioni, però l'infezione potrebbe aumentare il rischio di trasmissione dell'HIV, il virus che causa l'AIDS.

## Vaginosi Batterica

**Che cos'è e come si trasmette:** è una delle infezioni più diffuse nei paesi occidentali. È provocata da batteri anaerobi quali la *Gardnerella*, *Micoplasmi*, *Bacteroides*. Non c'è certezza di un'origine sessuale, anche se le donne sessualmente attive sono più soggette a questa infezione.

Fattori di rischio possono essere: indossare biancheria sintetica, portare indumenti stretti e utilizzare detergenti in quantità eccessive.

**Quali sono i sintomi:** non esiste una lesione specifica, ma è caratterizzata da perdite vaginali maleodoranti e da sintomi genitali (dolore, bruciore, dolore durante i rapporti sessuali). In più del 50% delle donne può non presentare sintomi. L'incubazione è di 1-2 settimane.

**Come si cura:** terapia antibiotica locale. La terapia per il partner non è prevista perché non comporta effetti benefici nella prevenzione delle recidive.

**Se non si cura:** si mantengono i disagi durante i rapporti sessuali.



## Sifilide

**Cos'è e come si trasmette:** la sifilide è un'infezione causata da un batterio a forma di spirale, il *Treponema pallidum*, che entra nel corpo attraverso piccole ferite della pelle o delle mucose genitali, del retto o della bocca. Questo batterio ha una bassa resistenza nell'ambiente esterno al corpo umano ed è molto sensibile ai comuni disinfettanti. Si può contrarre l'infezione attraverso rapporti sessuali con una persona infetta o, molto raramente, attraverso contatto indiretto con oggetti contaminati. Una volta dentro l'organismo, il *Treponema* usa la circolazione sanguigna e i vasi linfatici per diffondersi in tutto il corpo.

**Quali sono i sintomi:** il primo sintomo (infezione primaria o Sifiloma) è una piccola lesione, che compare 3-4 settimane dopo il contatto, nella zona del corpo in cui è avvenuto il contagio (genitali, ma anche cute, mucose, bocca, ecc.). Si tratta di un'ulcera, simile ad un foruncolo, con base dura e umida, di colore rosso vivo, coperta da siero. Poiché **non produce dolore**, spesso passa inosservata.

**Come si cura:** con la penicillina.

**Se non si cura:** 6-12 settimane dopo l'infezione inizia lo **stadio secondario (infezione secondaria o Macule papule)**. Nei pazienti di razza bianca compaiono macchioline tonde di colore rosa o rosso chiaro, nei pazienti di origine africana le macchie sono più scure del colore della pelle. Si ingrossano i linfonodi, possono comparire mal di testa, stanchezza, dolori delle ossa e febbre. I capelli possono cadere a ciocche e nelle zone umide della pelle, per esempio inguine o ascelle, compaiono chiazze grigie o rosa, **molto infettive**. Questa fase dura circa un anno ed è seguita dalla **fase di latenza:** sembra che tutto sia a posto, ma nel 30% dei casi la malattia prosegue fino alla fase terziaria. La **sifilide terziaria (infezione terziaria o Gomma)** può comparire dopo molti anni, anche 25. Distrugge i tessuti: ossa, lingua, pelle, vasi sanguigni. **Può essere mortale.**

**N.B.:** i soggetti colpiti da sifilide sono contagiosi nella fase primaria e secondaria, ma non nella fase latente e terziaria. È possibile essere infettati più volte.



# Epatite

**Cos'è e come si trasmette:** l'epatite è una malattia contagiosa che colpisce il fegato. Ci sono diversi tipi di virus che causano l'epatite:

- I virus dell'**epatite B e C** (HBV e HCV) si trovano nella saliva, sangue, sperma e secrezioni vaginali. Il contagio avviene quando questi liquidi vengono in contatto con il sangue o con le mucose di un soggetto sano, per esempio attraverso rapporti sessuali. Un ruolo di primaria importanza nel mantenere la catena di trasmissione è giocato dai portatori: persone che convivono con il virus, anche senza accusare disturbi, e possono trasmetterlo ad altri individui.
- Il virus dell'**epatite A** (HAV) si trasmette più frequentemente mangiando cibi contaminati, ma è possibile anche la trasmissione sessuale (via ano-orale) come dimostra la diffusione della malattia, in particolare tra gli omosessuali/bisessuali maschi. Al contrario della situazione precedente non esiste lo stato di portatore del virus dell'epatite A.

**Quali sono i sintomi:** l'epatite A si manifesta dopo 3-6 settimane dal contagio; le epatiti B e C possono manifestarsi mesi dopo l'infezione. I sintomi sono simili: malessere generale, dolori muscolari, fatica, perdita d'appetito, nausea, vomito e talvolta febbre; la pelle e gli occhi ingialliscono, le feci si sbiancano e l'urina diventa molto scura e spumosa. Chi scopre di avere l'epatite B deve avvisare il proprio partner, perché il virus è molto contagioso proprio durante il periodo di incubazione.

**Come si cura:** non ci sono vere cure per le epatiti in forma acuta e la malattia tende a guarire da sola. È importante mantenere uno stile di vita sano (riposo, dieta salutare, niente alcolici, ecc.), che dia all'organismo il tempo di reagire. A differenza dell'epatite A che non cronicizza, l'epatite B e l'epatite C possono diventare croniche. In casi selezionati, persone con epatite cronica possono trovare giovamento da trattamenti terapeutici, disponibili già da alcuni anni e gestiti sotto controllo specialistico.

**Come si previene:** per l'epatite B è disponibile un vaccino, sicuro ed efficace, obbligatorio per i nuovi nati e raccomandato per diverse categorie di persone. Per l'epatite C non esiste un vaccino ed osservare comportamenti corretti è l'unica misura veramente efficace per prevenirla.

**Se non si cura:** tende a guarire spontaneamente, ma l'epatite B e l'epatite C possono diventare croniche e provocare gravi danni al fegato, quali la cirrosi epatica e il tumore. In rarissimi casi l'epatite acuta può avere un'evoluzione fulminante; il trapianto di fegato può diventare l'unica soluzione terapeutica per salvare la vita del paziente.

**N.B.:** i virus dell'epatite B e C sono abbastanza diffusi in alcuni gruppi di popolazione. Per esempio l'80% dei tossicodipendenti da droghe iniettabili ha un'infezione da virus dell'epatite C.

## H.I.V / A.I.D.S.

**Cos'è e come si trasmette:** Con la sigla **H.I.V.** ("Human Immunodeficiency Virus", cioè "Virus della Immunodeficienza Umana") si individua il virus che può condurre all'**A.I.D.S.** ("Acquired ImmunoDeficiency Sindrome" / "Sindrome da Immunodeficienza Acquisita"), la più pericolosa delle malattie a trasmissione sessuale, l'infezione che produce un forte e progressivo indebolimento del sistema immunitario dell'organismo.

Tutte le persone possono infettarsi, indipendentemente dal sesso, dall'età o dalle abitudini sessuali. Chi è stato contagiato dall'HIV si definisce "**sieropositivo**". Una persona sieropositiva, fino a quando non compare l'AIDS, **può godere di buona salute, ma è lo stesso in grado di trasmettere il virus.**

Il virus si può trovare nel sangue e in altri liquidi biologici, quali: il liquido che precede l'eiaculazione, lo sperma, le secrezioni vaginali, il latte materno e la saliva.

Ci si può infettare in tre modi:

- attraverso rapporti sessuali, non protetti dal preservativo, con persone infette.
- attraverso il passaggio di sangue da una persona infetta ad una persona sana (es. lo scambio di siringhe infette).
- durante la gravidanza, il parto, l'allattamento, da madre sieropositiva.

Oltre il 98% delle infezioni da HIV viene trasmesso attraverso il rapporto sessuale.

Il virus può entrare nell'organismo principalmente attraverso le mucose della vagina e dell'ano durante rapporti sessuali, non protetti da profilattico, con una persona sieropositiva. Oggi i nuovi casi d'infezione sono dovuti prevalentemente a rapporti eterosessuali a rischio e l'AIDS è in aumento soprattutto tra le persone che, non ritenendosi a rischio, tendono ad avere rapporti sessuali non protetti.

L'eventuale presenza di malattie veneree (Herpes genitale, Sifilide, Gonorrea, ecc.) contribuisce ad aumentare il rischio di infezione.

Le procedure estetiche ed alcune terapeutiche (estetista, centri per l'ago puntura, per i tatuaggi e i piercing, ecc.), se accompagnate da fuoriuscita di sangue, possono determinare un rischio di esposizione al virus HIV; questo rischio è presente anche per i virus dell'epatite B e C. Bisogna quindi rivolgersi solo a professionisti presso strutture autorizzate ad operare e chiedere sempre aghi e strumenti monouso, controllando attentamente che non vengano riutilizzati, o in alternativa, strumenti sottoposti a trattamenti di sterilizzazione.

È importante seguire le normali regole igieniche: non scambiare depilatori elettrici ad ago, spazzolini da denti, rasoi, forbici appuntite, limette ed aghi.

L'effetto di droghe e alcool (da soli o in combinazione) può indurre una disinibizione nel rapporto con gli altri. Può far dimenticare i limiti, alterando la capacità di giudizio e abbassando la soglia di attenzione. Si possono così sottovalutare i rischi e avere comportamenti irresponsabili, lasciandosi andare a rapporti sessuali occasionali non protetti. In questo caso ci si espone alla possibilità di contrarre una malattia sessualmente trasmissibile, AIDS compresa.

**Come non si trasmette:** con la tosse, gli starnuti, le lacrime, il sudore, le strette di mano. Donando il sangue ad altri. Non si rischia il contagio neanche frequentando luoghi pubblici e servizi igienici.

Le carezze, i tocamenti, gli abbracci, tutte queste pratiche non comportano alcun rischio.

Il bacio, in presenza di sanguinamenti anche modesti e di lesioni delle mucose orali, comporta un rischio di contagio anche se non elevato.

**Quali sono i sintomi:** il sistema immunitario ci difende dalle infezioni. Quando si indebolisce, l'organismo subisce gravi danni, anche da parte di virus e batteri che normalmente non provocherebbero malattie.

Si possono così avere diverse infezioni chiamate "opportunistiche", dalla tubercolosi alla polmonite, dalle infezioni cerebrali ai tumori. Il tempo, che trascorre perché le persone sieropositive sviluppino l'AIDS, varia da individuo ad individuo. Possono passare anche molti anni.

**Come si cura:** Per l'AIDS non esiste ancora un vaccino o una cura risolutiva; attualmente sono presenti farmaci antivirali che ritardano l'evolvere della malattia.

Per evitare l'infezione da HIV, l'unica difesa è la prevenzione. Poche e semplici precauzioni possono concretamente aiutarci a combattere l'AIDS.

**Il test:** l'unico modo per accertare la presenza dell'infezione da HIV è quello di sottoporsi ad un semplice prelievo di sangue per effettuare il test HIV. Il test è gratuito.

In alcune strutture sanitarie (vedi pag. 25) viene svolto in anonimato. Non serve né la prescrizione del medico, né il tesserino sanitario.

Una persona è sieropositiva se nel suo sangue sono presenti i virus e gli anticorpi anti-HIV. Si può vivere anni senza sintomi, ma si è comunque portatori del virus e si può trasmettere l'infezione ad altri.

Perché il risultato sia sicuro deve passare un determinato periodo di tempo, "periodo finestra", che corrisponde alla fase in cui è avvenuta l'infezione, ma la produzione di anticorpi non è ancora cominciata o gli anticorpi prodotti non sono ancora sufficienti per essere rivelati dal test Hiv. In



## CONSULTORI FAMILIARI AUSL MODENA

### **Distretto di Modena**

Consultorio Familiare di Viale Molza 3

tel. 059/2134359

Consultorio Familiare di Via Don Minzoni 121

tel. 059/2134006

### **Distretto di Castelfranco Emilia**

Consultorio Familiare di Castelfranco Emilia

Via Martiri, 368 • tel. 059/929508

### **Distretto di Carpi**

Consultorio Familiare di Carpi

Via Don Sturzo, 21 • tel. 059/6554170

### **Distretto di Mirandola**

Consultorio Familiare di Mirandola

Via Smerieri, 3 • tel. 0535/602815

### **Distretto di Sassuolo**

Consultorio Familiare di Sassuolo

Via Alessandrini, 2 • tel. 0536/863788

### **Distretto di Pavullo**

Consultorio Familiare di Pavullo

Viale Martiri, 63 • tel. 0536/29369

### **Distretto di Vignola**

Consultorio Familiare di Vignola

Via XXV Aprile • tel. 059/777883

## Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena

### **Ambulatorio MST**

Ingresso 16 - tel. 059/4222673

Accesso diretto dal lunedì al venerdì  
dalle ore 8,30 alle ore 10

## CENTRI DI PRELIEVO TEST HIV IN ANONIMATO E GRATUITO

### Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena

#### **Ambulatorio di Malattie Infettive**

Modena • Via del Pozzo, 71 • tel. 059/4222120

Accesso diretto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12

### Azienda USL di Modena

#### **Carpi Ser.T del Distretto sanitario**

Piazzale Donatori di sangue, 3

Prelievo dal lunedì al sabato: dalle 9 alle 9,30 su appuntamento

Per prenotare tel. 059/659921 dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13,30

#### **Mirandola Ser.T del Distretto sanitario**

Via L. Smerieri, 3

Prelievo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 9,30 su appuntamento

Per prenotare tel. 0535/602434 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30

**Telefono verde  
regionale AIDS  
800 856 080**

**[www.helpaids.it](http://www.helpaids.it)**

**[www.stradanove.net](http://www.stradanove.net)**

**Testo a cura di:**

Fabia Businco - Azienda USL di Modena

Simona Casari - Azienda USL di Modena

con la supervisione della **Commissione interaziendale per la lotta all'AIDS**

Azienda USL di Modena

Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena

Ufficio Grafica del Comune di Modena

Stampato nel mese di novembre 2010 presso Artestampa

**Lo spazio giovani è un servizio di informazione ed educazione alla salute e alla sessualità. Operatori qualificati sono disponibili per fornire informazioni, chiarimenti, consulenze su tutto ciò che riguarda la vita affettiva e sessuale. Si può frequentare da soli, in coppia o in piccoli gruppi.**

## **Spazio Giovani Azienda USL Modena**

<b>Modena</b>	Viale Molza, 3 - tel. 059/2134366 • martedì e mercoledì: 14,30-18,30
<b>Spilamberto</b>	Via Marconi, 4 - tel. 059/7574528 • lunedì: 15-18
<b>Castelfranco Emilia</b>	Corso Martiri, 368 - tel. 059/929509 • mercoledì: 14,30-18,30
<b>Carpi</b>	Via Don Sturzo, 21 - tel. 059/6554176-170 • lunedì: 14,30-18
<b>Mirandola</b>	Via Smerieri, 3 - tel. 0535/602815 • lunedì: 14-17
<b>Sassuolo</b>	Via Alessandrini, 2 - tel. 0536/863717 • giovedì: 14,30-18,30
<b>Pavullo</b>	V.le Martiri, 63 - tel. 0536/29369-29373 • lunedì: 14-17,30